Rapsfungizide-Herbst

Mittel	Wirkstoff	Einstufung nach FRAC[5]	Aufwandmenge je ha	Preis/ha[1] EUR	Phoma-Wurzelhals- u. Stängelfäule	Standfestigkeit	Winterfestigkeit	Wartefrist in Tagen	Abstände zu Oberflächengewässern in m[2]	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr[3]	
Ampera	Prochloraz + Tebuconazol	3	1,5 l	43,60	-	X	-	-*	5/5/5/1	G-10	-
Cantus	Boscalid	7	0,5 kg	55,80	X	-	-	56	1	-	-
Cantus Gold	Boscalid + Dimoxystrobin	7,11	0,5 l	59,10	X	-	-	-*	5/5/1/1	-	-
Carax	Metconazol+Mepiquatchlorid	3	0,7-1,4 l/ha	28,00-56,00	X	X	X	-*	10/5/5/1	G-10	-
Contans WG[4]	Coniothyrium minitans	-	2,0 kg	75,90	-	-	-	-	1	-	-
Folicur	Tebuconazol	3	1,0-1,5 l	21,50-31,50	X	X	X	56	5/1/1/1	-	-
Icarus EW	Tebuconazol	3	1,5 l	?	X	X	X	-*	5/5/5/1	10-20	-
Magnello	Tebuconazol + Difonocanazol	3,3	0,8 l	37,20	X	-	-	-*	5/1/1/1	-	-
Mystic 250 EW	Tebuconazol	3	1,5 l	27,30	X	X	1 l	-*	15/10/5/5	G-10	15/10/10/10
Orefa Tebuconazol 250	Tebuconazol	3	1,5 l	?	X	X	1 l	-*	15/10/5/5	G-10	15/10/10/10
Orius	Tebuconazol	3	1,5 l	29,60	X	X	X	-*	5/5/5/1	10-20	-
Sirena	Metconazol	3	1,2 l	26,30	X	X	-	-*	5/5/1/1	-	-
Tebu Super 250 EW	Tebuconazol	3	1,0 l	14,80	X	-	X	60	5/5/1/1	G-20	20
Tebucur 250 EW	Tebuconazol	3	1,0 l	14,90	X	-	-	56	5/5/1/1	G-10	-
Tilmor	Prothioconazol + Tebuconazol	3 3	1,0 l	37,00	X	X	X	-*	10/5/5/1	G-10	-
Toprex	Paclobutrazol + Difenoconazol	3,3	0,35-0,5 l	25,60-36,50	X	X	-	-*	5/5/1/1	-	-

1) unverb. empf. Listenpreise 2018 exkl. Mwst; größte Verpackungseinheit
2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse
3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.
4) unmittelbar vor der Saat einarbeiten
5) FRAC-Einstufung (Fungizid-Wirkungsgruppen): Zur Vermeidung von Resistenzen unterschiedliche Wirkungsgruppen in Mischungen oder Spritzfolgen kombinieren
-* Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich