

# Grünland und Futterbau

Praxisbericht 2010 bis 2021

- **Feldfutterbau**  
Saatgutmischungen im Ertrags- und Nährstoffvergleich
- **Grünland**  
Düngung, Übersaat, Saatgutmischungen im Ertrags- und Nährstoffvergleich, Grünlanderneuerung



## INHALTSVERZEICHNIS

1. Grünland und Futterbau.....	3
1.1. Wichtiger Hinweis – Saatgutrekamation.....	4
1.2. Ampferfreiheit .....	4
2. Saatgutmischungsversuch 2009 bis 2011 ÖR Josef Steiner, Pöllan, Feistritz/Drau.....	5
3. Saatgutmischungsversuch 2008 Karl Sabitzer, Sankt Veit/Glan, Straßburg.....	6
4. Saatgutmischungsversuch 2012 bis 2013, LFS Stiegerhof.....	6
5. Nachsaat- und Düngerversuch 2011 bis 2012, Feldkirchen, 9560 Ossiach, Tauern 1, Aufzuchthof Ossiacher Tauern .....	8
6. Vergleich Rohrschwengel und Wiesenrispe 2014, Spittal/Drau Rennweg, St. Peter.....	9
7. Grünlanderneuerung 2014, Lind im Drautal.....	9
8. Saatgutmischungsversuch 2014 bis 2016, Spittal/Drau, Litzlhof, BZ Litzlhof .....	11
9. Grünlanderneuerung 2015, Wolfsberg, Auen 61.....	12
10. Saatgutmischungsversuch 2016 bis 2019 St. Veit/Glan, Weindorf, Schulgut Weindorf LFS Althofen .....	13
11. Saatgutmischungsversuch 2018 bis 2021 St. Veit/Glan, Weindorf, Schulgut Weindorf LFS Althofen .....	17
12. Vergleich Rohrschwengel, Wiesenschweidel u. Saatgutmischung 2017 bis 2020, Spittal/Drau, Faschendorf.....	22
13. Saatgutmischungsvergleich 2017 bis 2020, Spittal/Drau, Rosenheim (Glatthafer Saatgutmischung: Glatthafer, Hornklee, Knautgras, Wiesenrispe; ÖAG NI).....	25
14. Düngungsversuch 2020, Spittal/Drau, Rosenheim.....	28
15. Düngungsversuch 2021, Spittal/Drau, Rosenheim.....	29
15.1. Pflanzenbestandszusammensetzung und Rohproteinertrag.....	30

## 1. Grünland und Futterbau

In Kärnten werden 144.594 ha Grünland inkl. Almfutterfläche von den Bäuerinnen und Bauern bewirtschaftet. Davon werden 42.498 ha als „Wirtschaftsgrünland“ (Dauerweiden 15.210 ha, Drei- und Mehrnutzungswiesen 27.288 ha) genutzt. 101.378 ha werden als extensives Grünland, davon 9.903 ha Hutweiden, 37.881 ha, Ein- und Zweinutzungswiesen, 70 ha Streuwiesen, 49.483 ha Almfutterflächen und 1.010 ha Bergmäher bewirtschaftet.

Die biologische Grünlandfläche erreicht ein Flächenausmaß von 40.296 ha (inkl. Almfutterflächen 14.356 ha). Das Grünland bildet die Grundlage für die Rinderhaltung in Kärnten.

Das Grünland liefert ganzjährig Futter für Wiederkäuer. Wobei das Grünlandfutter wird zu 45 % als Grünfutter verfüttert, der Rest als Heu bzw. zu Grassilage konserviert.

Der Feldfutterbau hat wie das Grünland in Kärnten eine große Bedeutung. Auf einer Fläche von 13.562 ha (ohne Silomais) werden verschiedenste Feldfuttermischungen angebaut. Die klee grasbetonten Feldfutterbestände verbessern die Fruchtfolge und die Stickstoffbilanz.

Durch die Klee grasmischungen wird hofeigenes Rohprotein erzeugt, damit wird der Sojazukauf wesentlich reduziert. Der Einsatz von zugekauften Betriebsmitteln soll auf deren Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft werden.

Im Jahr 2021 wurden in Kärnten 22,04 ha Rotklee (Sorte Semperina) und 3,33 ha Knautgras (Sorte Husar) als Saatgut vermehrt.

## 1.1. Wichtiger Hinweis – Saatgutreklamation

Häufig wird die Meinung vertreten, dass Ampfersamen in den Mischungen enthalten sind, aber das kann auf Grund vieler Untersuchungen nicht bestätigt werden (obwohl dies auch nicht ganz ausgeschlossen werden soll). Nach praktischer Erfahrung ist jedoch bekannt, dass der im Boden lang keimfähige Ampfersamen im Zuge der Bodenvorbereitung in obere Bodenschichten kommen kann und hier ideale Keimbedingungen vorfindet. Saatgutreklamationen können nur durchgeführt werden, wenn 400g zur Untersuchung auf Fremdbesatz eingesendet werden. Deshalb empfiehlt es sich ein wenig Saatgut samt Saatgutetikett im Ansaatjahr von der gesäten Mischung aufzubewahren, falls es zu Saatgutreklamation kommen würde.

## 1.2. Ampferfreiheit

Bei den ÖAG-Saatgutmischungen werden 100g untersucht und es darf hier kein Ampfersamen enthalten sein. Bei den Handelsmischungen werden 50g untersucht und es dürfen hier 5 Samen darin vorkommen.

Leguminosenart	Kleekrebs	Stock-/Stengelälchen
Rotklee	++	+ (+)
Schwedenklee	0/(+)*	+
Inkarnatklee	++	0
Luzerne	0	0
Gelbklee	0	0
Weißklee	0	0
Alexandrinerklee	-	0
Perserklee	-	0

- keine Anfälligkeit, 0 nachgewiesen aber keine Bedeutung; + gering, ++ hoch;

\*0 als Mischungspartner von Gemengen; + als Hauptbestandteil in Gemengen oder Reinsaat

Die Ergebnisse von diesem Bericht geben einen Überblick über die möglichen Erträge der einzelnen Saatgutmischungen. Allerdings wurden die Ertragsmessungen teilweise auf zwei bis drei Quadratmetern durchgeführt. Die Parzellengröße ist bei den Versuchsergebnissen jeweils angeführt.

## 2. Saatgutmischungsversuch 2009 bis 2011 ÖR Josef Steiner, Pöllan, Feistritz/Drau

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen 2009 bis 2011													
Pro Jahr wurde ein Schnitt ausgewertet				Parzellenfläche: 2 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet									
Standort: ÖR Josef Steiner, Pöllan, Feistritz/Drau				Vorfrucht: Wechselwiese									
Bezirk: Villach Land				Anlage: 07.04.2009									
Versuchsform: Parzellenversuch				Ertragsmessung von 2009 bis 2011: pro Jahr ein Schnitt, in Summe 3 Schnitte									
Saatgutmischung	Firma	Frisch-masse t/ha	Trockensubstanz %	Trockenmasse t/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL/TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast-tiere pro ha	Verdaulichkeit in %
Dauerwiesenmischung für feuchte Lagen	Die Saat	27,74	23,6	6,54	1024	36 772	5,80	107	104	14 846	11 912	2,06	72,80
Wechselwiesenmischung für milde und mittlere Lagen	Die Saat	28,93	22,1	6,40	1119	37 415	6,01	109	113	14 682	13 010	2,09	73,93
Nachsaatmischung für intensivgenutzte Wiesen und Feldfutterbestände	Die Saat	26,14	22,4	5,86	1025	34 650	6,06	101	104	13 474	11 915	1,94	73,10
Nachsaatmischung für Dauerwiesen, Dauerweiden und Feldfutterbestände	Die Saat	22,06	23,5	5,19	904	30 580	6,04	89	92	11 489	10 513	1,71	73,07
Luzerne-Rotkleeegrasmischung für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre	Die Saat	28,10	23,2	6,51	1188	39 394	6,13	115	120	14 671	13 814	2,21	73,37
Feldfutter-Intensivmischung für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre für raue Lagen	Die Saat	23,93	23,7	5,67	968	33 509	5,97	98	98	12 856	11 254	1,88	73,07
MG 500 mit Klee	Kärntner Saatbau	22,27	24,1	5,36	851	31 255	5,93	91	86	12 014	9 894	1,75	72,13
Grünlandprofi Topp Intensivmischung für kleelose Nachsaat oder Neuanlage	Saatbau Linz	23,73	23,5	5,58	874	31 468	5,80	92	89	12 729	10 161	1,76	73,70
Grünlandprofi NA Nachsaatwiese für Dauerweide und Dauerwiesen in allen Lagen	Saatbau Linz	25,92	23,8	6,18	970	35 984	5,92	105	98	14 124	11 277	2,02	72,63
Grünlandprofi NI Nachsaatmischung für Intensivwiesen und -weiden	Saatbau Linz	28,68	23,4	6,71	1112	38 994	5,78	114	113	14 795	12 935	2,19	72,17
Futterprofi KR Kleeegrasmischung für zwei Hauptnutzungsjahre in rauen Lagen	Saatbau Linz	27,21	23,8	6,48	1152	38 721	5,93	113	117	15 034	13 390	2,17	72,70
Futterprofi WM Wechselwiesenmischung für drei und mehr Hauptnutzungsjahre für milde Lagen	Saatbau Linz	26,85	22,8	6,13	997	35 559	5,81	104	101	13 839	11 589	1,99	73,33
Futterprofi KM Kleeegrasmischung für zwei Hauptnutzungsjahre in mittleren und milden Lagen	Saatbau Linz	32,17	21,1	6,80	1214	40 349	5,99	118	123	15 925	14 117	2,26	73,67
Futterprofi EK Einjährige, nicht überwinternde Kleeegrasmischung nur von 2009 bis 2010	Saatbau Linz	9,83	25,0	2,46	422	14 547	5,94	43	43	6 049	4 908	0,81	74,50
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>987</b>	<b>34 228</b>	<b>5,94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch													
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch													

### 3. Saatgutmischungsversuch 2008 Karl Sabitzer, Sankt Veit/Glan, Straßburg

<b>Versuch: Grünland- und Feldfuttermischungen</b>		Parzellenfläche: 2000 m <sup>2</sup>								
Standort: Straßburg (Gurktal)		Vorfrucht: Wechselwiese								
Bezirk: Sankt Veit an der Glan		Anlage: 01.08.2008								
Betrieb: Karl Sabitzer, Winklern 3, 9341 Straßburg		Ertragsmessung: in Summe 2 Schnitte								
Versuchsform: Parzellenversuch										
Saatgutmischung	Saatgutfirma	Frisch- masse t/ha	Trockensu- bstanz %	Trockenm- asse t/ha	Gesamt- eiweiß kg/ha	Gesamten ergie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ %1)	Ertrag relativ % 2)	kg Milch (FCM)/ha
Dauerweidemischung G (mit Deckfrucht)	Die Saat	24,30	23,6	5,73	759	34 223	5,92	103	111	10 830
Dauerweidemischung G (ohne Deckfrucht)	Die Saat	23,95	24,2	5,80	683	34 174	5,95	103	100	10 815
Nachsaatmischung NI (mit Deckfrucht)	Die Saat	26,65	23,0	6,12	723	35 517	5,97	107	106	11 240
Nachsaatmischung NI (ohne Deckfrucht)	Die Saat	22,25	24,8	5,52	746	33 719	5,98	102	109	10 671
Luzerne.-Rotkleeegrasmischung LR	Die Saat	18,60	28,9	5,37	600	30 136	5,66	91	88	9 537
Wechselwiesenmischung ohne Deckfrucht	Die Saat	16,85	28,2	4,75	572	28 439	5,95	86	84	9 000
Wechselwiesenmischung WM	Die Saat	17,75	30,8	5,46	651	32 392	6	98	96	10 251
Kleeegrasmischung KR	Die Saat	23,75	25,5	6,06	722	36 396	6,1	110	106	11 518
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>681,98</b>	<b>33 125</b>	<b>5,94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch										
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch										

### 4. Saatgutmischungsversuch 2012 bis 2013, LFS Stiegerhof

**Versuch: Grünland- und Feldfuttermischungen**

**Versuchsdurchschnitt 2012 bis 2013 pro Schnitt**

Landwirtschaftliche Fachschule Stiegerhof

Vorfrucht: Wechselwiese

Anlage: 07.09.2011

Parzellenfläche: 4 bzw. 2 m<sup>2</sup> wurden ausgewertet

Saatgutmischung	Firma	Frischmasse t/ha	Trockensubstanz %	Trockenmasse t/ha	Gesamteiweiß kg/ha	Gesamtenergie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ %1)	Ertrag relativ % 2)	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha
Kleegrasmischung KR	Saatbau Linz	12,2	26,3	2.077	420	16.389	5,92	125	134	5.186	4.885
Wechselwiesenmischung	Die Saat	11,8	32,43	2.447	347	16.140	5,78	124	111	5.108	4.038
Kleegrasmischung KR	Die Saat	9,6	28,8	1.845	395	15.141	5,88	116	126	4.791	4.591
Kleegrasmischung KR	Samena	8,5	31,8	1.577	294	12.658	5,76	97	94	4.006	3.422
Nachsaatmischung NIK	Die Saat	9,9	32,7	1.846	316	12.339	5,70	94	101	3.905	3.679
Nachsaatmischung KWEI <sup>1)</sup> *	Die Saat	11,7	21,9	2.266	297	12.309	5,54	94	95	3.895	3.451
Nachsaatmischung NA	Die Saat	7,8	36,0	1.675	284	12.167	5,92	93	91	3.850	3.298
Wechselwiesenmischung	Saatbau Linz	8,0	31,0	1.561	260	11.522	5,91	88	83	3.646	3.018
Happy Horse	n.b.	7,7	37,7	1.640	233	10.643	5,81	81	74	3.368	2.705
Nachsaatmischung	Saatbau Linz	6,5	38,7	1.472	244	10.603	5,75	81	78	3.355	2.837
Nachsaatmischung	Samena	7,4	35,0	1.489	263	10.372	5,89	79	84	3.283	3.054
Wechselwiesenmischung	Samena	7,2	31,5	1.483	253	10.179	5,94	78	81	3.221	2.938
Dauerwiesenmischung B	Die Saat	7,7	30,1	1.379	230	10.021	5,80	77	74	3.171	2.676
MG 500	Kärntner Saatbau	7,6	34,2	1.467	233	9.309	5,74	71	74	2.946	2.702
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>313</b>	<b>13.061</b>	<b>6,26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch

<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch

)\* nur einjährig geprüft

#### Saatgutmischungsversuch LFS Stiegerhof - Schlussfolgerungen:

- Die Saatgutmischungen von Die Saat und von der Saatbau Linz zeigten ihre Ertragsstärken
- Die Kleegrasmischungen sind für den Feldfutterbau bestens geeignet und könnten auch im Jahr der Trockenheit gut überzeugen
- Bei allen Mischungen konnte sich das Knaulgras und das Raygras gut bis sehr gut entwickeln
- Die Saatgutmischung von der Kärntner Saatbau zeigte ihre Stärken in der Narbendichte

## 5. Nachsaat- und Düngerversuch 2011 bis 2012, Feldkirchen, 9560 Ossiach, Tauern 1, Aufzuchtshof Ossiacher Tauern

Durchschnitt vom Versuch Ossiacher Tauern 2011 und 2012										
Sorte	Firma	Frischmasse t/ha	Trockenmasse t/ha	Gesamteiweiß kg/ha	Gesamtenergie MJ NEL/ha	Ertrag relativ %1)	Ertrag relativ % 2)	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Masttiere pro ha
Kalk Düngung mit Kohlensäuren Kalk feucht		13,58	4 481	550	24 849	134	159	7 864	6395	1,41
Naturphosphat Parzelle Düngung mit Stickstoff und Phosphor		13,58	4 354	538	24 134	130	155	7 637	6254	1,37
MG 500 mit Klee	Kärntner Saatbau	13,58	4 183	517	23 185	125	149	7 337	6011	1,31
Nachsaatmischung für Intensivwiesen und -weiden Grünlandprofi NI	Saatbaulinz	13,58	4 091	502	22 706	123	145	7 186	5839	1,29
Nachsaatmischung für Dauerwiesen, Dauerweiden und Feldfutterbau für alle Lagen (NA)	Die Saat	13,58	4 008	490	22 260	120	142	7 044	5695	1,26
Nachsaatmischung für Dauerwiesen, Dauerweiden und Feldfutterbau extrem für intensive Bewirtschaftung (NEXTREM)	Die Saat	13,58	3 919	479	21 699	117	139	6 867	5574	1,23
Nachsaatmischung für Dauerwiesen, Dauerweiden und Feldfutterbau mit Luzerne und Glatthafer für trockene Lagen (NATRO)	Die Saat	13,58	3 829	470	21 285	115	136	6 736	5463	1,21
Nachsaatmischung für Dauerweiden, Dauerwiesen und Feldfutterbau für trockene Lagen (NAWEI)	Die Saat	13,58	3 824	468	21 234	115	135	6 719	5443	1,20
unbehandelte Kontrollfläche		13,58	3 791	471	21 059	114	136	6 664	5479	1,19
Nachsaatmischung für intensivgenutzte (4- und mehrmähdige) Wiesen und Feldfutterbestände für alle Lagen (NI)	Die Saat	13,58	3 740	456	20 753	112	132	6 567	5300	1,18
MG 500 ohne Klee	Kärntner Saatbau	13,58	3 595	440	19 932	108	127	6 308	5120	1,13
Knautgras und "deutsches Weidegras" (20g Knautgras, 60g Deutsches Weidegras)		13,58	3 258	395	18 094	98	114	5 726	4595	1,02
<b>Durchschnitt Versuch</b>				<b>346</b>	<b>18 518</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch										
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch										

### Ossiacher Tauern Übersaat- und Düngerversuch - Schlussfolgerungen:

- Ständige Übersaat ohne mechanische (händische Übersaat) Bearbeitung kein Erfolg
- Düngung beachten, sie ist effizienter als die Übersaat
- standortgerechte Bewirtschaftung und Düngung beachten
- Einsatz von Nachsaatgeräten wesentlich besser als die Übersaat per Hand

## 6. Vergleich Rohrschwengel und Wiesenrispe 2014, Spittal/Drau Rennweg, St. Peter

<b>Versuch: Grünland- und Feldfuttermischungen für trockene Lagen</b>		Parzellenfläche: 1 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet									
Standort: Johann Meißnitzer, St. Peter 25, 9863 Rennweg am Katschberg											
Bezirk: Spittal an der Drau											
		Ernte: 23.09.2014									
Versuchsform: Parzellenversuch											
Sorte	Firma	Frischmasse t/ha	Trockensubstanz %	Trockenmasse t/ha	Gesamteiweiß kg/ha	Gesamtenergie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprote in) pro ha
Rohrschwengel Probe 1	Schaumann	19,7	18,5	3,6	521	21.976	6,03	148	132	4.410	3.590
Wiesenrispe Probe 2		8,3	20,6	2	270	10.071	5,89	68	68	4.308	3.054
Grünfutter Probe 3		12	16,9	2	395	12.533	6,18	84	100	3.734	2.395
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>395</b>	<b>14.860</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch											
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch											

## 7. Grünlanderneuerung 2014, Lind im Drautal

<b>Versuch: Grünlanderneuerung</b>		Parzellenfläche: 1 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet										
Standort: Lind im Drautal		Vorfrucht: Wechselwiese										
Bezirk: Spittal an der Drau		Anlage: Juli 2014										
Versuchsform: Parzellenversuch		Ernte: 25.09.2015										
Sorte	Firma	Frischmasse t/ha	Trockensubstanz %	Trockenmasse t/ha	Gesamteiweiß kg/ha	Gesamtenergie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %
alte Grasnarbe		0,32	16,9	0,05	109	3 407	6,3	76	63	1 078	74,5	18,7
Grünlanderneuerung	LK-Kärnten	0,60	14,9	0,09	239	5 614	6,28	124	137	1 777	73,7	19,9
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>174</b>	<b>4 511</b>	<b>6,29</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch												
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch												

**Versuch: Grünlanderneuerung**

**Standort: Lind im Drautal**

**Bezirk: Spittal an der Drau,**

**Bildaufnahme vor der Ernte am 25.09.2015**



## 8. Saatgutmischungsversuch 2014 bis 2016, Spittal/Drau, Litzlhof, BZ Litzlhof

<b>Versuch: Grünland- und Feldfuttermischungen</b>													
Versuchsdurchschnitt 2014 bis 2016				Parzellenfläche: 1 m <sup>2</sup> wurde ausgewertet									
Standort: Landwirtschaftliche Fachschule Litzlhof				Vorfrucht: Getreide									
Bezirk: Spittal an der Drau				Anlage: 15.04.2014									
BIOLOGISCH				Ernte: vier Schnitte in Summe									
Versuchsform: Parzellenversuch													
Sorte	Firma	Frischmasse t/ha	Trockensubstanz %	Trockenmasse t/ha	Gesamteiweiß kg/ha	Gesamtenergie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %
Feldfutter-Intensivmischung (IM)	Die Saat	46,00	14,9	6,87	1233	42 403	6,36	114	110	13 419	14 332	75,98	20,68
Dauerwiesenmischung (A)	Die Saat	56,70	14,2	8,05	1004	34 878	6,15	94	90	11 037	11 675	74,13	22,53
Luzernegrasmischung (LG)	Die Saat	52,50	14,8	7,74	1486	45 936	6,21	123	133	14 537	17 276	74,53	22,15
Dauerwiesenmischung (VS)	Die Saat	46,60	15,3	7,11	1349	43 791	6,32	117	121	13 858	15 684	75,58	21,05
Futterprofi (WM)	SBL	36,10	15,7	5,65	906	32 894	6,12	88	81	10 410	10 530	73,80	23,08
Futterprofi (LG)	SBL	40,20	15,0	6,03	1130	36 124	6,14	97	101	11 432	13 136	74,73	21,7
Nachsaatmischung Grünlandprofi (KB)	SBL	31,70	15,3	4,85	814	27 963	6,25	75	73	8 849	9 463	75,13	21,48
Futterprofi LR	SBL	36,40	16,5	5,99	1022	34 320	6,14	92	91	10 861	11 888	73,53	23,55
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>1118</b>	<b>37 289</b>	<b>6,21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch													
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch													

### Saatgutmischungsversuch LFS Litzlhof Schlussfolgerungen:

- Die Saatgutmischungen von Die Saat haben im zweiten Jahr gute Erträge gebracht
- Die Luzerne konnte sich nur dort durchsetzen, wo der Boden auch dafür geeignet war. Die Luzerne war bei der Ernte sehr grob im Griff, obwohl die Ernte rechtzeitig erfolgte.
- Bei allen Mischungen konnten sich das Knaulgras und das Englische Raygras gut entwickeln. Die Raygräser waren bei der Ernte im Entwicklungsstadium immer vor dem Knaulgras.

## 9. Grünlanderneuerung 2015, Wolfsberg, Auen 61

<b>Praxisschauversuch: Grünlanderneuerung</b>													
<b>Standort: Weber Helmut, Auen, 9400 Wolfsberg</b>			<b>Parzellenfläche: 1 m<sup>2</sup> wurden ausgewertet</b>										
<b>Bezirk: Wolfsberg</b>			<b>Ernte: 09.10.2015, 2. Schnitt</b>										
<b>Bodenbearbeitungsgerät</b>	<b>Frischmasse t/ha</b>	<b>Trockensubstanz %</b>	<b>Trockenmasse t/ha</b>	<b>Gesamteiweiß kg/ha</b>	<b>Gesamtenergie MJ NEL/ha</b>	<b>MJ NEL kg/TM</b>	<b>Ertrag relativ %1)</b>	<b>Ertrag relativ % 2)</b>	<b>kg Milch (FCM)/ha</b>	<b>kg Milch (Rohprotein) pro ha</b>	<b>Anzahl der Masttiere pro ha</b>	<b>Verdaulichkeit in %</b>	<b>Rohfaser in %</b>
Geohobel	7,40	18,30	1,35	229	8 355	6,17	144	125	2 644	2661	0,47	74,00	22,80
Pflug	8,90	16,50	1,47	295	9 163	6,24	158	161	2 900	3432	0,51	74,10	22,90
Altbestand	2,40	17,40	0,42	95	2 652	6,35	46	52	839	1107	0,15	76,40	19,70
Geohobel	2,80	17,50	0,49	116	3 043	6,21	52	63	963	1345	0,17	74,60	21,70
<b>Durchschnitt Versuch</b>				<b>184</b>	<b>5 803</b>	<b>6,24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
1) Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch													
2) Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch													



Der Geohobel ist eine Alternative zu den herkömmlichen Grünlandsanierungsgeräten.

## 10. Saatgutmischungsversuch 2016 bis 2019 St. Veit/Glan, Weindorf, Schulgut Weindorf LFS Althofen

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 20 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Standort: Schulgut Weindorf		Vorfrucht: Wechselwiese													
Bezirk: Sankt Veit an der Glan		Anlage: September 2014													
Versuchsform: Parzellenversuch		Ernte: 22.05.2017, 1. Schnitt													
Saatgutmischung	Firma	Frisch-masse t/ha	Trockensubstan- z %	Trockenmasse t/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %	
Feldfutter-Intensivmischung für raue Lagen (IR)	Die Saat	19	24,9	4,79	508	28 184	5,88	93	95	8 919	5 908	1,59	70,20	30,40	
Kleegrasmischung KR	Die Saat	16	25,9	4,21	396	25 084	5,96	82	74	7 938	4 600	1,41	70,80	29,90	
Kleegrasmischung KM	Die Saat	17	26,4	4,42	460	26 090	5,9	86	86	8 256	5 348	1,47	70,10	30,60	
Luzerne-Rotkleegrasmischung LR	Die Saat	13	25,5	3,32	388	20 851	6,29	68	73	6 599	4 510	1,16	73,30	27,50	
Wechselwiesenmischung WM	Die Saat	18	26,4	4,82	487	28 908	6	95	91	9 148	5 658	1,62	71,30	29,30	
Dauerwiesenmischung B	Die Saat	16	26,9	4,17	417	24 308	5,83	80	78	7 692	4 848	1,37	69,60	31,10	
Dauerwiesenmischung D	Die Saat	18	27,1	4,88	527	28 829	5,91	95	99	9 123	6 126	1,63	70,00	30,90	
Nachsaatmischung NA	Die Saat	20	27,9	5,58	569	33 313	5,97	109	107	10 542	6 618	1,88	70,60	30,30	
Nachsaatmischung NATRO	Die Saat	22	28,0	6,09	688	36 175	5,94	119	129	11 448	8 002	2,04	70,30	30,50	
Nachsaatmischung NI	Die Saat	18	28,6	5,08	599	30 916	6,09	102	112	9 784	6 965	1,73	71,80	28,90	
Wiesenschwingel		24	27,2	6,55	695	40 823	6,23	134	130	12 919	8 077	2,27	73,40	27,40	
Wiesenschweidel		29	22,4	6,41	661	41 887	6,53	138	124	13 255	7 683	2,31	76,00	24,80	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>533</b>	<b>30 447</b>	<b>6,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															

Wiesenschweidel (Wiesenschwingel \* Englisches Raygras)

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 20 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet												
Standort: Schulgut Weindorf		Vorfrucht: Wechselwiese												
Bezirk: Sankt Veit an der Glan		Anlage: September 2014												
		Ernte: 04.07.2017, 2. Schnitt												
Versuchsform: Parzellenversuch														
Saatgutmischung	Firma	Frischmasse t/ha	Trocken-substanz %	Trockenmasse t/ha	Gesamteiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Masttiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %
Feldfutter-Intensivmischung für raue Lagen (IR)	Die Saat	8,25	30,60	2,52	356	14 768	5,85	102	96	4 674	4 139	0,55	69,90	28,10
Kleegrasmischung KR	Die Saat	7,75	29,90	2,32	304	13 533	5,84	93	82	4 283	3 530	0,76	70,10	27,80
Kleegrasmischung KM	Die Saat	8,00	26,60	2,13	287	12 491	5,87	86	78	3 953	3 340	0,70	70,20	27,70
Luzerne-Rotkleegrasmischung LR	Die Saat	11,00	28,10	3,09	371	17 186	5,56	118	100	5 439	4 313	0,98	67,20	31,20
Wechselwiesenmischung WM	Die Saat	9,50	27,60	2,62	362	14 972	5,71	103	98	4 738	4 207	0,85	68,60	29,50
Dauerwiesenmischung B	Die Saat	9,50	28,00	2,66	375	15 268	5,74	105	102	4 832	4 361	0,87	68,90	29,20
Dauerwiesenmischung D	Die Saat	8,50	30,10	2,56	358	15 274	5,97	105	97	4 834	4 165	0,86	70,90	30,10
Nachsaatmischung NA	Die Saat	7,25	28,90	2,10	302	12 634	6,03	87	82	3 998	3 508	0,71	71,30	26,60
Nachsaatmischung NATRO	Die Saat	10,00	27,00	2,70	427	15 579	5,77	107	116	4 930	4 960	0,88	69,00	29,10
Nachsaatmischung NI	Die Saat	8,25	27,70	2,29	359	13 369	5,85	92	97	4 231	4 172	0,76	69,50	28,60
Wiesenschwingel		13,18	28,00	3,69	557	22 180	6,01	153	151	7 019	6 480	1,24	72,90	24,10
Wiesenschweidel		12,73	27,70	3,53	374	20 798	5,90	143	101	6 582	4 345	1,17	71,70	25,80
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>369</b>	<b>14 507</b>	<b>5,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch														
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch														

Die Verwendung von Festulolium (Wiesenschweidel – Kreuzung zwischen Englischem Raygras und verschiedenen Schwingelarten) in Grünlandmischungen für trockene Lagen wurde im Expertenkreis diskutiert. Eine Sortenprüfung dazu ist derzeit im Laufen und sollte dann als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stehen ob der Wiesenschweidel in den ÖAG-Saatgutmischungen eingesetzt wird.



Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 20 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet												
Standort: Schulgut Weindorf		Vorfrucht: Wechselwiese												
Bezirk: Sankt Veit an der Glan		Anlage: September 2014												
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag 2018 (3 Schnitte; Sommertrockenheit im August)												
Saatgutmischung	Firma	Frisch-masse t/ha	Trockensubstanz z %	Trockenmasse t/ha	Gesamteiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % 2)	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %
Feldfutter-Intensivmischung für raue Lagen (IR)	Die Saat	38,75	23,37	9,05	1105	45 036	5,62	87	89	14 252	12 853	2,44	68,43	30,00
Kleegrasmischung KR	Die Saat	36,50	23,87	8,71	1148	48 287	5,83	94	92	15 281	13 348	2,73	69,83	28,97
Kleegrasmischung KM	Die Saat	41,25	23,47	9,68	1401	53 249	5,87	103	112	16 851	16 288	3,01	70,10	28,60
Luzerne-Rotklee-Grasmischung LR	Die Saat	30,25	24,50	7,41	989	41 552	5,74	81	79	13 149	11 497	2,36	68,67	31,13
Wechselwiesenmischung WM	Die Saat	40,75	24,16	9,85	1242	53 422	5,73	104	100	16 906	14 438	3,03	69,20	29,47
Dauerwiesenmischung B	Die Saat	41,75	23,60	9,85	1323	53 828	5,68	104	106	17 034	15 378	3,06	68,50	30,27
Dauerwiesenmischung D	Die Saat	43,00	25,53	10,98	1325	56 321	5,39	109	106	17 823	15 405	3,18	69,87	26,70
Nachsaatmischung NA	Die Saat	42,25	23,03	9,73	1312	54 208	5,90	105	105	17 154	15 251	3,06	70,43	28,40
Nachsaatmischung NATRO	Die Saat	42,75	22,63	9,68	1270	53 261	5,68	103	102	16 855	14 773	3,02	68,40	30,47
Nachsaatmischung NI	Die Saat	45,75	22,40	10,25	1346	56 449	5,82	109	108	17 864	15 654	3,20	69,13	29,90
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>1246</b>	<b>51 561</b>	<b>5,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch														
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch														

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 20 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet												
Durchschnitt von Versuch 2016 bis 2018		Vorfrucht: Wechselwiese												
Standort: Schulgut Weindorf		Anlage: September 2014												
Bezirk: Sankt Veit an der Glan		Erträge: von 2016 bis 2018 im Durchschnitt												
Versuchsform: Parzellenversuch														
Saatgutmischung	Firma	Frisch-masse t/ha	Trockensubstanz z %	Trockenmasse t/ha	Gesamteiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % 2)	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %
Feldfutter-Intensivmischung für raue Lagen (IR)	Die Saat	58,42	24,04	14,05	1255	58 367	5,71	96	96	17 458	15 030	3,20	70,99	27,94
Kleegrasmischung KR	Die Saat	53,00	25,06	13,28	1156	55 718	5,82	92	88	16 781	13 194	3,15	70,02	28,83
Kleegrasmischung KM	Die Saat	59,13	23,74	14,04	1298	60 601	5,80	100	99	17 989	15 377	3,42	69,77	28,97
Luzerne-Rotklee-Grasmischung LR	Die Saat	51,78	24,62	12,75	1165	53 287	5,72	88	89	15 804	13 167	3,02	68,80	30,46
Wechselwiesenmischung WM	Die Saat	58,33	24,95	14,56	1260	63 324	5,81	104	96	19 027	14 921	3,57	69,91	28,95
Dauerwiesenmischung B	Die Saat	58,42	23,86	13,94	1332	60 064	5,80	99	102	17 883	15 062	3,40	69,66	29,20
Dauerwiesenmischung D	Die Saat	57,67	25,80	14,88	1332	63 016	5,72	104	102	18 805	15 327	3,56	70,31	28,31
Nachsaatmischung NA	Die Saat	57,47	24,80	14,25	1355	62 913	5,89	103	104	18 640	15 296	3,55	70,42	27,53
Nachsaatmischung NATRO	Die Saat	59,83	23,73	14,20	1416	64 179	5,77	105	108	18 714	16 811	3,63	69,61	25,63
Nachsaatmischung NI	Die Saat	63,32	23,61	14,95	1522	67 035	5,89	110	116	19 835	18 065	3,79	70,21	25,80
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>1309</b>	<b>60 851</b>	<b>5,79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch														
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch														


Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 20 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Standort: Schulgut Weindorf		Vorfrucht: Wechselwiese													
Bezirk: Sankt Veit an der Glan		Anlage: September 2014													
Versuchsform: Parzellenversuch		Ernte: Ertragsdurchschnitt 2019													
Saatgutmischung	Firma	Frisch- masse t/ha	Trockensu- bstanz %	Trockenm- asse t/ha	Gesamt- eiweiß kg/ha	Gesamt- energie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % 1)	Ertrag relativ % 2)	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotei- n) pro ha	Anzahl der Mast-tiere pro ha	Verdaulich- keit in %	Rohfaser in %	
Feldfutter-Intensivmischung für raue Lagen (IR)	Die Saat	36	21,9	7,76	1295	49 788	5,73	114	120	10 123	15 060	2,53	71,77	25,30	
Kleegrasmischung KR	Die Saat	34	21,5	7,36	1038	43 438	5,92	100	97	8 445	12 072	2,44	72,17	25,73	
Kleegrasmischung KM	Die Saat	35	21,3	7,39	1097	43 249	5,83	99	102	8 453	12 758	2,44	70,53	27,67	
Luzerne-Rotkleegrasmischung LR	Die Saat	32	22,4	7,23	972	40 692	5,69	93	90	7 755	11 297	2,30	69,87	28,20	
Wechselwiesenmischung WM	Die Saat	30	23,9	7,16	995	41 570	5,88	95	93	8 122	11 571	2,34	70,83	27,50	
Dauerwiesenmischung B	Die Saat	29	24,7	7,23	961	41 695	5,87	96	89	8 540	11 173	2,35	70,57	27,87	
Dauerwiesenmischung D	Die Saat	32	24,9	7,92	1131	44 235	5,79	101	105	9 175	13 151	2,48	71,60	25,83	
Nachsaatmischung NA	Die Saat	34	24,0	8,16	1137	44 748	5,89	103	106	10 058	13 223	2,51	72,33	25,20	
Nachsaatmischung NATRO	Die Saat	34	22,5	7,61	1084	43 981	5,87	101	101	9 500	12 603	2,47	72,03	25,60	
Nachsaatmischung NI	Die Saat	31	23,9	7,40	1042	42 969	5,95	98	97	9 534	12 122	2,41	71,97	26,03	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>1075</b>	<b>43 637</b>	<b>5,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 20 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Durchschnitt von Versuch 2016 bis 2019		Vorfrucht: Wechselwiese													
Standort: Schulgut Weindorf		Anlage: September 2014													
Bezirk: Sankt Veit an der Glan		Jahreserträge: von 2016 bis 2019													
Versuchsform: Parzellenversuch															
Saatgutmischung	Firma	Frisch- masse t/ha	Trockensu- bstanz %	Trockenm- asse t/ha	Gesamtei- weiß kg/ha	Gesamt- energie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % 1)	Ertrag relativ % 2)	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotei- n) pro ha	Anzahl der Mast-tiere pro ha	Verdaulich- keit in %	Rohfaser in %	
Feldfutter-Intensivmischung für raue Lagen (IR)	Die Saat	46,96	22,96	9,14	1275	54 077	5,72	106	109	13 791	15 045	2,87	71,38	26,62	
Kleegrasmischung KR	Die Saat	46,33	23,28	8,94	1147	50 902	5,87	100	98	12 613	13 551	2,79	71,09	27,25	
Kleegrasmischung KM	Die Saat	46,58	22,51	8,95	1176	50 808	5,81	100	101	13 221	13 894	2,93	70,15	28,31	
Luzerne-Rotkleegrasmischung LR	Die Saat	45,33	23,53	8,87	1113	49 530	5,70	97	96	11 779	13 164	2,66	69,33	29,32	
Wechselwiesenmischung WM	Die Saat	44,21	24,41	8,83	1125	49 969	5,85	98	97	13 574	13 300	2,96	70,37	28,18	
Dauerwiesenmischung B	Die Saat	43,83	24,29	8,87	1108	50 031	5,83	98	95	13 211	13 101	2,87	70,11	28,52	
Dauerwiesenmischung D	Die Saat	45,08	25,37	9,21	1193	51 301	5,75	101	102	13 990	14 091	3,02	70,96	26,97	
Nachsaatmischung NA	Die Saat	46,21	24,40	9,33	1196	51 558	5,89	101	103	14 349	14 127	3,03	71,38	26,76	
Nachsaatmischung NATRO	Die Saat	46,08	23,13	9,06	1169	51 174	5,82	100	100	14 107	13 817	3,05	70,82	27,51	
Nachsaatmischung NI	Die Saat	44,71	23,74	8,95	1149	50 668	5,92	99	99	14 684	13 576	3,10	71,09	27,47	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>1165</b>	<b>51 002</b>	<b>5,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															


# 11. Saatgutmischungsversuch 2018 bis 2021 St. Veit/Glan, Weindorf, Schulgut Weindorf LFS Althofen

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 20 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet												
Standort: Schulgut Weindorf		Vorfrucht: Wechselwiese												
Bezirk: Sankt Veit an der Glan		Anlage: April 2018 (bis zum dritten Schnitt wurden Schröpfschnitte durchgeführt)												
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag 2019 3Schnitte; Sommertrockenheit im Juli)												
Saatgutmischung	Firma	Frisch- masse t/ha	Trockensu- bstanz %	Trockenm- asse t/ha	Gesamtei- weiß kg/ha	Gesamt- energie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotei- n) pro ha	Anzahl der Mast-tiere pro ha	Verdaulich- keit in %	Rohfaser in %
Greenstar intensiv Plus	Schaumann	50,00	19,10	9,55	1673	57 608	6,02	98	105	18 230	19 453	3,22	73,13	24,67
020R mit Klee	Unser Lagerhaus	46,00	18,03	8,30	1446	50 915	6,11	87	91	16 112	16 812	2,84	73,47	24,70
Nachsaat Mantelsaat intensiv	Kärntner Saatbau	54,50	19,47	10,61	1789	63 503	6,00	108	113	20 096	20 804	3,57	71,87	26,47
Nachsaatmischung Kwei für Kurzrasenweide	Die Saat	49,50	18,67	9,24	1667	57 348	6,23	97	105	18 148	19 382	3,20	74,27	23,77
Nachsaatmischung NI	Die Saat	50,50	18,73	9,46	1684	58 540	6,15	100	106	18 525	19 586	3,27	73,17	25,27
Nachsaatmischung NA mit Klee	Austrosaat	48,50	21,17	10,27	1575	57 823	5,68	98	99	18 298	18 308	3,16	72,03	24,00
Nachsaat MG 500	Kärntner Saatbau	40,75	20,73	8,45	1276	48 754	5,81	83	80	15 428	14 839	2,75	70,40	27,77
Nachsaatmischung NA Samena Spezial	Samena	51,75	20,33	10,52	1592	61 090	5,80	104	100	19 332	18 511	3,44	70,90	26,93
Nachsaatmischung NATRO	Die Saat	50,50	20,13	10,17	1441	57 572	5,67	98	91	18 219	16 756	3,25	69,73	28,17
Schweizer Mattenkle	Unser Lagerhaus	61,00	17,87	10,90	2187	68 188	6,36	116	138	21 578	25 436	3,76	75,97	21,97
Futtermischung mit Hornklee mehrjährig	Ing. Hans Egger	60,75	19,77	12,01	1603	66 463	5,49	113	101	21 033	18 636	3,78	67,23	31,33
Futtermischung mit Schweizer Mattenkle mehrjährig	Ing. Hans Egger	62,00	19,20	11,90	1722	66 239	5,51	113	108	20 962	20 028	3,77	67,37	31,17
Futtermischung trockene Lagen mit Wiesenschweidel	Ing. Hans Egger	57,25	19,77	11,32	1531	62 221	5,47	106	96	19 690	17 799	3,54	67,17	31,20
Dauerwiesenmischung für rauhe Lagen D	Die Saat	39,25	22,13	8,69	1250	50 526	5,68	86	79	15 989	14 535	2,84	70,97	26,33
Dauerwiesenmischung für mittlere Lagen B	Die Saat	49,00	20,70	10,14	1444	56 650	5,55	96	91	17 927	16 787	3,22	68,03	30,17
Dauerwiesenmischung für feuchte Lagen C	Die Saat	49,00	20,77	10,18	1529	57 800	5,73	98	96	18 291	17 780	3,25	70,10	28,00
Wechselwiesenmischung für milde und mittlere Lagen WM	Die Saat	52,25	20,50	10,71	1596	61 737	5,73	105	100	19 537	18 555	3,49	69,40	28,97
Wechselwiesenmischung für raue Lagen WR	Die Saat	45,75	21,93	10,03	1433	55 673	5,58	95	90	17 618	16 660	3,15	69,80	27,77
Kleegrasmischung für raue Lagen KR	Die Saat	59,50	19,27	11,46	1953	67 604	5,96	115	123	21 394	22 709	3,79	72,00	26,10
Feldfutter-Intensivmischung für raue Lagen IR	Die Saat	46,75	22,40	10,47	1587	61 003	5,94	104	100	19 305	18 458	3,43	72,00	26,10
Luzerne-Rotkleegrasmischung für raue Lagen LR	Die Saat	56,25	20,80	11,70	1834	64 633	5,69	110	116	20 453	21 327	3,66	69,20	29,17
Esparsette	Unser Lagerhaus	36,00	18,80	6,77	1119	42 401	6,52	72	70	13 418	13 011	2,34	76,85	21,85
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>1588</b>	<b>58 831</b>	<b>5,85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch														
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch														

Praxischauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 20 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Standort: Schulgut Weindorf		Vorfrucht: Wechselwiese													
Bezirk: Sankt Veit an der Glan		Anlage: April 2018 (bis zum dritten Schnitt wurden Schröpfungsschnitte durchgeführt)													
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag 2018 bis 2019 ; Sommertrockenheit													
Saatgutmischung	Firma	Frisch- masse t/ha	Trockensu- bstanz %	Trockenm- asse t/ha	Gesamtei- eiß kg/ha	Gesamt- energie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotei- n) pro ha	Anzahl der Mast-tiere pro ha	Verdaulich- keit in %	Rohfaser in %	
Greenstar intensiv Plus	Schaumann	76,50	19,80	15,15	2508	89 729	6,00	99	104	28 395	29 163	5,03	72,79	24,68	
020R mit Klee	Unser Lagerhaus	72,50	19,27	13,97	2281	83 037	6,04	91	94	26 277	26 522	4,64	72,96	24,70	
Nachsaat Mantelsaat intensiv	Kärntner Saatbau	81,00	19,98	16,19	2624	95 624	5,99	105	108	30 261	30 514	5,37	72,16	25,58	
Nachsaatmischung Kwei für Kurzrasenweide	Die Saat	76,00	19,58	14,88	2502	89 469	6,10	98	103	28 313	29 092	5,00	73,36	24,23	
Nachsaatmischung NI	Die Saat	77,00	19,62	15,10	2519	90 661	6,06	100	104	28 690	29 296	5,07	72,81	24,98	
Nachsaatmischung NA mit Klee	Austro Saat	75,00	20,83	15,63	2410	89 944	5,83	99	99	28 463	28 018	4,96	72,24	24,35	
Nachsaat MG 500	Kärntner Saatbau	67,25	20,62	13,86	2111	80 875	5,89	89	87	25 593	24 549	4,55	71,43	26,23	
Nachsaatmischung NA Samena Spezial	Samena	78,25	20,42	15,98	2427	93 212	5,89	102	100	29 497	28 221	5,24	71,68	25,82	
Nachsaatmischung NATRO	Die Saat	77,00	20,32	15,64	2276	89 693	5,82	99	94	28 384	26 466	5,05	71,09	26,43	
Schweizer Mattenklees	Unser Lagerhaus	87,50	19,18	16,79	3023	100 309	6,17	110	125	31 743	35 146	5,56	74,21	23,33	
Futtermischung mit Hornklees mehrjährig	Ing. Hans Egger	87,25	20,13	17,57	2438	98 585	5,73	108	101	31 198	28 346	5,58	69,84	28,02	
Futtermischung mit Schweizer Mattenklees mehrjährig	Ing. Hans Egger	88,50	19,85	17,57	2557	98 361	5,74	108	106	31 127	29 738	5,57	69,91	27,93	
Futtermischung trockene Lagen mit Wiesenschweidel	Ing. Hans Egger	83,75	20,13	16,86	2366	94 342	5,72	104	98	29 855	27 509	5,34	69,81	27,95	
Dauerwiesenmischung für rauhe Lagen D	Die Saat	65,75	21,32	14,02	2085	82 648	5,83	91	86	26 154	24 245	4,64	71,71	25,52	
Dauerwiesenmischung für mittlere Lagen B	Die Saat	75,50	20,60	15,55	2279	88 772	5,76	98	94	28 092	26 498	5,02	70,24	27,43	
Dauerwiesenmischung für feuchte Lagen C	Die Saat	75,50	20,63	15,58	2364	89 921	5,85	99	98	28 456	27 490	5,06	71,28	26,35	
Wechselwiesenmischung für milde und mittlere Lagen WM	Die Saat	78,75	20,50	16,14	2431	93 858	5,85	103	100	29 702	28 265	5,29	70,93	26,83	
Wechselwiesenmischung für rauhe Lagen WR	Die Saat	72,25	21,22	15,33	2268	87 794	5,78	97	94	27 783	26 370	4,95	71,13	26,23	
Kleegrasmischung für rauhe Lagen KR	Die Saat	86,00	19,88	17,10	2788	99 725	5,97	110	115	31 558	32 420	5,59	72,23	25,40	
Feldfutter-Intensivmischung für rauhe Lagen IR	Die Saat	73,25	21,45	15,71	2422	93 124	5,96	102	100	29 470	28 168	5,23	72,23	25,40	
Luzerne-Rotkleegrasmischung für rauhe Lagen LR	Die Saat	82,75	20,65	17,09	2669	96 754	5,83	106	110	30 618	31 037	5,46	70,83	26,93	
Esparssette	Unser Lagerhaus	62,50	19,65	12,28	1954	74 522	6,25	82	81	23 583	22 721	4,14	74,65	23,28	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>2423</b>	<b>90 953</b>	<b>5,91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															



Die Kleeegrasmischung für raue Lagen (IR) erreichte den höchsten Qualitätsertrag (2018 bis 2019).



Der Schweizermattenklee ist ein sehr guter Rohproteinlieferant. (Beide Bilder, Bildaufnahme 29.06.2019)

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 20 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Standort: Schulgut Weindorf		Vorfrucht: Wechselwiese													
Bezirk: Sankt Veit an der Glan		Anlage: April 2018 (bis zum dritten Schnitt wurden Schröpschnitte durchgeführt)													
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag 2020 3 Schnitte													
Saatgutmischung	Firma	Frischmasse t/ha	Trockensubstanz %	Trockenmasse t/ha	Gesamteiweiß kg/ha	Gesamtenergie MJ NEL/ha	MJ NEL kg/TM	Ertrag relativ % 1)	Ertrag relativ % 2)	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast-tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %	
Greenstar intensiv Plus	Schaumann	50,50	18,50	9,34	1690	56 749	5,94	118	162	17 958	16 554	3,09	71,50	27,50	
020R mit Klee	Unser Lagerhaus	36,25	19,63	7,12	1171	45 871	5,98	95	112	14 516	12 012	2,51	72,00	26,67	
Nachsaat Mantelsaat intensiv	Kärntner Saatbau	46,50	19,53	9,08	1175	53 745	5,88	111	112	17 008	15 579	3,47	72,77	25,77	
Nachsaatmischung Kwei für Kurzrasenweide	Die Saat	35,25	21,30	7,51	1140	48 200	5,79	100	109	15 253	13 438	2,73	72,33	25,87	
Nachsaatmischung NI	Die Saat	46,75	20,33	9,51	1162	56 006	5,52	116	111	17 723	15 096	3,29	71,37	27,77	
Nachsaatmischung NA mit Klee	Austrosaat	43,50	19,73	8,58	1084	47 972	5,40	99	104	15 181	14 354	3,06	70,97	27,77	
Nachsaat MG 500	Kärntner Saatbau	42,75	21,00	8,98	965	47 321	5,39	98	92	14 975	12 200	2,77	69,40	28,90	
Nachsaatmischung NA Samena Spezial	Samena	43,75	20,57	9,00	982	48 639	5,52	101	94	15 392	15 175	3,38	69,80	28,77	
Nachsaatmischung NATRO	Die Saat	47,25	19,23	9,09	1054	48 704	5,41	101	101	15 413	14 094	3,11	69,83	29,17	
Schweizer Mattenkle	Unser Lagerhaus	42,00	20,43	8,58	1237	46 652	5,67	97	118	14 763	19 358	3,25	74,33	22,13	
Futtermischung mit Hornklee mehrjährig	Ing. Hans Egger	45,00	20,73	9,33	950	47 292	5,36	98	91	14 966	15 145	3,50	67,40	31,00	
Futtermischung mit Schweizer Mattenkle mehrjährig	Ing. Hans Egger	45,75	19,83	9,07	944	48 023	5,49	100	90	15 197	15 656	3,50	69,13	31,27	
Futtermischung trockene Lagen mit Wiesenschweidel	Ing. Hans Egger	43,75	20,50	8,97	888	46 589	5,46	97	85	14 743	13 876	3,33	68,17	30,57	
Dauerwiesenmischung für raue Lagen D	Die Saat	36,75	20,53	7,55	868	42 817	5,76	89	83	13 550	11 940	2,74	71,70	27,00	
Dauerwiesenmischung für mittlere Lagen B	Die Saat	40,00	21,60	8,64	914	45 851	5,46	95	87	14 510	13 544	3,10	68,73	29,33	
Dauerwiesenmischung für feuchte Lagen C	Die Saat	40,75	21,23	8,65	926	44 820	5,31	93	89	14 184	14 718	3,14	70,20	26,50	
Wechselwiesenmischung für milde und mittlere Lagen WM	Die Saat	40,75	21,07	8,58	887	45 471	5,38	94	85	14 389	13 600	3,11	69,63	28,53	
Wechselwiesenmischung für raue Lagen WR	Die Saat	38,25	20,93	8,01	836	42 542	5,50	88	80	13 463	12 996	2,84	70,03	28,20	
Kleegrasmischung für raue Lagen KR	Die Saat	45,50	20,60	9,37	965	49 392	5,40	102	92	15 630	16 273	3,52	70,13	28,07	
Feldfutter-Intensivmischung für raue Lagen IR	Die Saat	45,75	19,83	9,07	1043	48 193	5,50	100	100	15 251	12 790	2,91	70,97	27,03	
Luzerne-Rotkleegrasmischung für raue Lagen LR	Die Saat	50,50	20,63	10,42	1083	52 202	5,18	108	104	16 520	15 717	3,35	69,17	28,50	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>1046</b>	<b>48 241</b>	<b>5,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						

<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch

<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch

<b>Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen</b>		<b>Parzellenfläche: 20 m<sup>2</sup> wurden ausgewertet</b>													
<b>Standort: Schulgut Weindorf</b>		<b>Vorfrucht: Wechselwiese</b>													
<b>Bezirk: Sankt Veit an der Glan</b>		<b>Anlage: April 2018 (bis zum dritten Schnitt wurden Schröpfungsschnitte durchgeführt)</b>													
<b>Versuchsform: Parzellenversuch</b>		<b>Jahresertrag 2018 bis 2020 ; Sommer trockenheit</b>													
<b>Saatgutmischung</b>	<b>Firma</b>	<b>Frish-masse t/ha</b>	<b>Trockensu-bstanz %</b>	<b>Trockenma-asse t/ha</b>	<b>Gesamteiw-eiße kg/ha</b>	<b>Gesamt-energie MJ NEL/ha</b>	<b>MJ NEL kg/TM</b>	<b>Ertrag relativ % 1)</b>	<b>Ertrag relativ % 2)</b>	<b>kg Milch (FCM)/ha</b>	<b>kg Milch (Rohprotei-n) pro ha</b>	<b>Anzahl der Mast-tiere pro ha</b>	<b>Verdaulich-keit in %</b>	<b>Rohfaser in %</b>	
Greenstar intensiv Plus	Schaumann	42,50	19,17	8,15	4214	145 619	5,95	113	144	46 082	42 819	7,97	71,82	26,57	
020R mit Klee	Unser Lagerhaus	33,00	19,92	6,57	3177	123 864	5,98	96	109	39 197	33 734	6,82	72,15	26,01	
Nachsaat Mantelsaat intensiv	Kärntner Saatbau	39,83	19,86	7,91	3185	139 612	5,91	109	109	44 181	40 868	8,75	72,66	25,41	
Nachsaatmischung Kwei für Kurzrasenweide	Die Saat	32,33	21,03	6,80	3115	128 521	5,85	100	106	40 671	36 585	7,27	72,37	25,48	
Nachsaatmischung NI	Die Saat	40,00	20,39	8,16	3160	144 132	5,67	112	108	45 612	39 902	8,39	71,73	26,74	
Nachsaatmischung NA mit Klee	Austroaat	37,83	19,99	7,56	3003	128 066	5,59	100	103	40 527	38 418	7,93	71,46	26,74	
Nachsaat MG 500	Kärntner Saatbau	37,33	20,83	7,78	2765	126 764	5,59	99	94	40 115	34 110	7,35	70,42	27,50	
Nachsaatmischung NA Samena Spezial	Samena	38,00	20,54	7,81	2799	129 399	5,67	101	96	40 949	40 061	8,56	70,68	27,41	
Nachsaatmischung NATRO	Die Saat	40,33	19,66	7,93	2942	129 530	5,60	101	101	40 990	37 899	8,03	70,71	27,68	
Schweizer Mattenkle	Unser Lagerhaus	36,83	20,46	7,53	3309	125 424	5,77	98	113	39 691	48 425	8,29	73,71	22,99	
Futtermischung mit Hornkle mehrjährig	Ing. Hans Egger	38,83	20,66	8,02	2734	126 706	5,57	99	93	40 097	40 001	8,80	69,08	28,90	
Futtermischung mit Schweizer Mattenkle mehrjährig	Ing. Hans Egger	39,33	20,06	7,89	2724	128 167	5,65	100	93	40 559	41 022	8,79	70,24	29,08	
Futtermischung trockene Lagen mit Wiesenschweidel	Ing. Hans Egger	38,00	20,50	7,79	2612	125 300	5,63	97	89	39 652	37 462	8,45	69,59	28,61	
Dauerwiesenmischung für rauhe Lagen D	Die Saat	33,33	20,52	6,84	2571	117 756	5,83	92	88	37 265	33 589	7,28	71,95	26,23	
Dauerwiesenmischung für mittlere Lagen B	Die Saat	35,50	21,23	7,54	2663	123 823	5,63	96	91	39 185	36 797	8,00	69,97	27,79	
Dauerwiesenmischung für feuchte Lagen C	Die Saat	36,00	20,99	7,56	2686	121 762	5,53	95	92	38 532	39 146	8,09	70,95	25,90	
Wechselwiesenmischung für milde und mittlere Lagen WM	Die Saat	36,00	20,88	7,52	2608	123 063	5,58	96	89	38 944	36 910	8,02	70,57	27,26	
Wechselwiesenmischung für raue Lagen WR	Die Saat	34,33	20,79	7,14	2506	117 206	5,66	91	86	37 090	35 701	7,49	70,84	27,03	
Kleegrasmischung für raue Lagen KR	Die Saat	39,17	20,57	8,06	2765	130 905	5,59	102	94	41 426	42 255	8,84	70,91	26,94	
Feldfutter-Intensivmischung für raue Lagen IR	Die Saat	39,33	20,06	7,89	2920	128 507	5,66	100	100	40 667	35 290	7,62	71,46	26,26	
Luzerne-Rotkleegrasmischung für raue Lagen LR	Die Saat	42,50	20,59	8,75	3001	136 525	5,44	106	103	43 204	41 145	8,51	70,26	27,23	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>2927</b>	<b>128 602</b>	<b>5,68</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															

## 12. Vergleich Rohrschwengel, Wiesenschweidel u. Saatgutmischung 2017 bis 2020, Spittal/Drau, Faschendorf

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 26,5 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Standort: Faschendorf		Vorfrucht: Wintertriticale													
Bezirk: Spittal an der Drau		Anlage: 15. August 2016, Grubber und Kreiselegge													
Versuchsform: Parzellenversuch		Ertragsdurchschnitt 2017: erster, zweiter und vierter Schnitt													
Saatgutmischung	Firma	Frischmasse kg/ha	Trockensubstan- z %	Trockenmasse kg/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL pro kg TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %	
Wiesenschweidel mit Rotklee	SBL	19 276	17,4	3 354	406	20 627	6,15	128	137	6 527	4 719	1,14	75,10	19,10	
Wiesenschweidel	SBL	14 254	23,7	3 373	247	18 837	5,93	117	83	5 961	2 867	1,06	72,33	26,17	
Rohrschwengel	KSB	6 257	24,5	1 530	156	8 163	3,80	51	53	2 583	1 810	0,46	70,80	26,40	
ÖAG (N+NA+B)	Die Saat	15 084	21,0	3 163	375	16 990	5,73	105	127	5 377	4 361	0,96	70,33	27,67	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					296	16 154	5,40	100	100						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															
Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 26,5 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Standort: Faschendorf		Vorfrucht: Wintertriticale													
Bezirk: Spittal an der Drau		Anlage: 15. August 2016, Grubber und Kreiselegge													
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag: vier Schnitte 2018													
Saatgutmischung	Firma	Frischmasse kg/ha	Trockensubstan- z %	Trockenmasse kg/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL pro kg TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %	
Wiesenschweidel	SBL	65 649	18,4	12 047	1133	58 992	5,72	97	89	18 668	13 179	3,36	70,10	27,60	
Rohrschwengel	KSB	54 396	21,2	11 545	1252	64 023	5,61	105	98	20 260	14 560	3,64	69,03	29,05	
ÖAG (N+NA+B)	Die Saat	56 238	18,9	10 643	1444	59 563	5,77	98	113	18 849	16 790	3,38	70,00	27,93	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					1276	60 859	5,70	100	100						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															



*Links im Bild: Wiesenschweidel, rechts im Bild Rohrschwengel*



dunkelgrüner Grünlandbestand *links im Bild* ÖAG-Saatgutmischung (NI)  
*Rechts im Bild* Glatthafermischung (Glatthafer 31,25 % (Sorte: Median),  
Knaulgras 31,25 % (Sorte: Amba), Wiesenrispe 31,25% (Sorte: Balin),  
Hornklee 6,25 % (Sorte: Leo)



Wiesenschweidel



Wiesenschweidel mit Klee

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 26,5 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Standort: Faschendorf		Vorfrucht: Wintertriticale													
Bezirk: Spittal an der Drau		Anlage: 15. August 2016, Grubber und Kreiselegge													
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag: fünf Schnitte 2019													
Saatgutmischung	Firma	Frischmasse kg/ha	Trockensubstanz z %	Trockenmasse kg/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL pro kg TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %	
Wiesenschweidel	SBL	71 834	17,3	12 133	1905	72 985	6,03	104	105	23 096	22 154	4,08	73,38	24,95	
Rohrschwengel	KSB	51 638	20,6	10 625	1406	61 446	5,79	88	78	19 445	16 354	3,46	70,90	27,30	
ÖAG (NI+NA+B)	Die Saat	70 898	17,5	12 194	2117	75 566	6,17	108	117	23 913	24 620	4,21	73,98	23,58	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>1810</b>	<b>69 999</b>	<b>5,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															



**Links im Bild:** Wiesenschweidel; **Bildmitte:** Rohrschwengel;  
**Rechts im Bild:** ÖAG-Saatgutmischung (NI+NA+B)  
 (Bildaufnahme: 16.08.2019)

Beim Wiesenschweidel und beim Rohrschwengel kam der Weißkleeanteil von selbst. Beide Gräser haben eine sehr gute Narbendichte.

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 26,5 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet												
Standort: Faschendorf		Vorfrucht: Wintertriticale												
Bezirk: Spittal an der Drau		Anlage: 15. August 2016, Grubber und Kreiselegge												
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag: fünf Schnitte 2020												
Saatgutmischung	Firma	Frischmasse kg/ha	Trockensubstanz z %	Trockenmasse kg/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL pro kg TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %
Wiesenschweidel	SBL	80 283	17,1	13 577	2559	84 780	6,26	103	115	26 829	29 759	4,71	75,56	21,83
Rohrschwengel	KSB	66 037	20,9	13 246	1859	79 199	5,99	96	83	25 063	21 618	4,46	73,04	25,48
ÖAG (NI+NA+B)	Die Saat	63 518	22,0	13 511	2285	83 922	6,18	102	102	26 558	26 571	4,67	74,30	23,98
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>2235</b>	<b>82 634</b>	<b>6,14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch														
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch														

### 13. Saatgutmischungsvergleich 2017 bis 2020, Spittal/Drau, Rosenheim (Glatthafer Saatgutmischung: Glatthafer, Hornklee, Knaulgras, Wiesenrispe; ÖAG NI)

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 26,5 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet												
Standort: Rosenheim		Vorfrucht: Wintertriticale												
Bezirk: Spittal an der Drau		Anlage: 15. August 2016, Pflug, Kreiselegger+Sähmaschine												
Versuchsform: Parzellenversuch		Ertragsdurchschnitt: zweiter, dritter und fünfter Schnitt 2017												
Saatgutmischung	Firma	Frischmasse kg/ha	Trockensubstanz z %	Trockenmasse kg/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL pro kg TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %
Glatthafermischung	Egger	34 415	23,2	7 993	1167	44 948	5,98	98	97	14 224	13 572	2,53	71,60	29,20
ÖAG NI	Die Saat	39 891	20,8	8 287	1239	46 422	5,79	102	103	14 691	14 410	2,62	70,23	27,68
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>1203</b>	<b>45 685</b>	<b>5,89</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch														
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch														

<b>Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen</b>		Parzellenfläche: 26,5 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Standort: Rosenheim		Vorfrucht: Wintertriticale													
Bezirk: Spittal an der Drau		Anlage: 15. August 2016, Pflug, Kreiselegge+Sähmaschine													
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag: 5 Schnitte 2018													
Saatgutmischung	Firma	Frischmasse kg/ha	Trockensubstan- z %	Trockenmasse kg/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL pro kg TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %	
Glatthafer/Knaulgras/Wiesenrispe/Hornklee-Mischung	Egger	44 955	22,3	10 007	1417	58 553	6,16	99	97	18 529	16 478	3,28	72,92	28,14	
ÖAG NI	Die Saat	56 489	19,6	11 049	1501	59 254	5,92	101	103	18 751	17 459	3,34	71,22	27,34	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					1459	58 903	6,04	100	100						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															

<b>Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen</b>		Parzellenfläche: 26,5 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Standort: Rosenheim		Vorfrucht: Wintertriticale													
Bezirk: Spittal an der Drau		Anlage: 15. August 2016, Pflug, Kreiselegge+Sähmaschine													
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag: 5 Schnitte 2019													
Saatgutmischung	Firma	Frischmasse kg/ha	Trockensubstan- z %	Trockenmasse kg/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL pro kg TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %	
Glatthafer/Knaulgras/Wiesenrispe/Hornklee-Mischung	Egger	54 122	20,1	10 900	2260	69 252	6,43	92	97	21 915	26 284	3,85	74,90	23,12	
ÖAG NI	Die Saat	72 811	18,2	13 252	2405	81 328	6,11	108	103	25 737	27 963	4,55	71,92	25,88	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					2333	75 290	6,27	100	100						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															



**Links im Bild:** ÖAG-Nachsaatmischung für Gunstlagen bei intensiver Bewirtschaftung mit Klee.

**Rechts im Bild:** Glatthafermischung (Glatthafer 31,25 % (Sorte: Median), Knautgras 31,25 % (Sorte: Amba), Wiesenrispe 31,25% (Sorte: Balin), Hornklee 6,25 % (Sorte: Leo)


(Bildaufnahme: 10.06.2018)

Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen		Parzellenfläche: 26,5 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet													
Standort: Rosenheim		Vorfrucht: Wintertriticale													
Bezirk: Spittal an der Drau		Anlage: 15. August 2016, Pflug, Kreiselegge+Sähmaschine													
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag: 1 Schnitt 2020													
Saatgutmischung	Firma	Frischmasse kg/ha	Trockensubstanz z %	Trockenmasse kg/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL pro kg TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast- tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %	
Glatthafer/Knautgras/Wiesenrispe/Hornklee-Mischung	Egger	14 281	19,1	2 728	486	18 958	6,95	88	83	5 999	5 646	1,04	79,70	20,80	
ÖAG NI	Die Saat	18 799	18,1	3 403	681	24 023	7,06	112	117	7 602	7 913	1,31	81,30	19,10	
<b>Durchschnitt Versuch</b>					<b>583</b>	<b>21 490</b>	<b>7,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch															
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch															

# 14. Düngungsversuch 2020, Spittal/Drau, Rosenheim


<b>Praxisschauversuch: Düngungsversuch</b>		Parzellenfläche: 26,5 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet												
Standort: Rosenheim		Vorfrucht: Wintertriticale												
Bezirk: Spittal an der Drau		Anlage: 15. August 2016, Pflug, Kreiselegge+Sähmaschine												
Versuchsform: Parzellenversuch		Jahresertrag: 2 Schnitte 2020 (07.05. und 12.06.)												
Saatgutmischung	Frischmasse kg/ha	Trockensubstanz %	Trockenmasse kg/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL pro kg TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Masttiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %	
60 er Kali plus Gülle	23 190	20,5	4 755	816	30 488	6,41	85	85	9 648	9 490	1,72	76,00	22,55	
NAC plus Gülle	30 703	21,0	6 432	1101	41 453	6,41	115	115	13 118	12 805	2,30	75,50	23,40	
<b>Durchschnitt Versuch</b>				<b>959</b>	<b>35 971</b>	<b>6,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch														
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch														

Grafik: Praxisdüngungsversuch 2020 zwei Schnitte (30% Mehrertrag durch die mineralische N-Düngung), Düngemittelpreis Frühjahr 2020







### 15. Düngungsversuch 2021, Spittal/Drau, Rosenheim


<b>Praxisschauversuch: Grünland- und Feldfuttermischungen</b>		Parzellenfläche: 23,5 m <sup>2</sup> wurden ausgewertet											
Standort: Rosenheim													
Bezirk: Spittal an der Drau													
		Jahresertrag: fünf Schnitte 2021											
Versuchsform: Parzellenversuch													
Düngungsvariante	Frischmasse kg/ha	Trockensubstanz z %	Trockenmasse kg/ha	Gesamt-eiweiß kg/ha	Gesamt-energie MJ NEL/ha	MJ NEL pro kg TM	Ertrag relativ % <sup>1)</sup>	Ertrag relativ % <sup>2)</sup>	kg Milch (FCM)/ha	kg Milch (Rohprotein) pro ha	Anzahl der Mast-tiere pro ha	Verdaulichkeit in %	Rohfaser in %
Grünland mit NAC u. Gülle	65 510	19,0	11 728	2107	72 761	6,25	118	128	23 026	24 498	4,06	74,38	24,23
Rotklee gras Gülle	43 638	21,3	8 793	1270	55 601	6,32	90	77	17 595	14 767	3,08	75,08	23,48
Rotklee gras NAC u. Gülle	44 753	22,5	8 985	1559	57 044	6,40	92	95	18 052	18 123	3,17	75,90	22,63
<b>Durchschnitt Versuch</b>				<b>1645</b>	<b>61 802</b>	<b>6,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
<sup>1)</sup> Energieertrag (MJ NEL/ha) relativ in % vom Ø Versuch													
<sup>2)</sup> Eiweißertrag pro ha relativ in % vom Ø Versuch													



## 15.1. Pflanzenbestandszusammensetzung und Rohproteinерtrag



Rohrprotein- und Trockenmassenerträge von Kärnten 2007 bis 2012  
 (Quelle: HBLA-Raumberg-Gumpenstein)



**Kontakt:**

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten  
Referat Pflanzliche Produktion  
Ing. Hans Egger  
Museumgasse 5  
9020 Klagenfurt  
Tel.: 0463 5850-0  
e-mail: pflanzenbau@lk-kaernten.at

**Fachliche Auskünfte:**

DI Erich Roscher,  
0463/5850-1420  
Ing. Hans Egger,  
0463/5850-1425

**Impressum:**

**Herausgeber:**

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten  
Referat Pflanzliche Produktion  
DI Erich Roscher  
Museumgasse 5  
9020 Klagenfurt  
Dezember 2021

**Wir bedanken uns bei den Saatgutfirmen für die Bereitstellung des Saatgutes  
sowie bei den Landwirten und bei den landwirtschaftlichen Fachschulen  
für die Versuchsdurchführungen.**

Die Weitergabe oder Präsentation von Ergebnissen (auch nur auszugsweise) ist nur  
unter Quellenangabe gestattet.