

# Ackerbohne



Sorte, Züchterland	Zulassungsjahr	Blütenfarbe	Auswinterung	Jugendentwicklung	Reifezeit	Wuchshöhe	Lagerung	Stängelbruch	Virosen	Rost	Botrytis	Korntrag	Tausendkorntasse	Proteingehalt	Korntrag in Rel%	Rohproteinertrag in Rel%	Rohproteingehalt in % (TRM)
<b>SOMMERACKERBOHNE:</b>																	
Alexia, A	2007	B	-	7	5	5	6	5	4	5	6	8	5	4	103	99	-1,4
Birgit, D	2017	B	-	7	5	6	4	5	4	5	5	7	6	6	100	103	+0,7
GL Emilia, A	2017	B	-	5	5	5	4	7	5	5	5	3	5	6	80	83	+1,5
GL Jasmin, A	2019	B	-	5	8	4	4	5	2	2	3	9	7	4	110	108	-0,7
GL Lucia, A	2018	B	-	8	7	7	4	5	4	3	3	8	8	5	102	102	±0,0
GL Magnolia, A	2017	B	-	7	6	7	5	3	5	5	5	6	7	7	95	102	+1,9
GL Sunrise, A	2017	W	-	6	6	3	3	5	3	3	5	6	6	8	98	105	+2,2
Gloria, A	1993	W	-	5	5	3	5	6	5	6	5	3	5	9	80	90	+4,6
Gracia, A	2007	B	-	6	6	5	3	3	3	5	5	6	7	3			
Julia, A	2007	B	-	6	5	6	4	4	4	5	4	6	6	6	97	101	+1,4
Standardmittel, dt/ha															29,7	7,7	30,5%
<b>WINTERACKERBOHNE<sup>1)</sup>:</b>																	
GL Alice, A	2017	B	7	7	5	7	5	5	4	3	6	7	8	5	105	105	+0,1
GL Arabella, A	2017	B	7	7	3	5	4	5	5	4	6	6	7	5	95	95	-0,1
Standardmittel, dt/ha															38,5	9,9	29,7%

**Blütenfarbe:** W = weißblühend, B = buntblühend

**1)** Merkmalsausprägung mit Sommerform nicht direkt vergleichbar (Blühbeginn, Reife)

**Versuchsorte:** NÖ: Grabenegg, Schönfeld; OÖ: Ritzlhof, Freistadt, Hagenberg; **Stmk:** Gleisdorf, Weiz

## Ackerbohne 2006-2019

